

FAQS

KAN MAN VÆRE STAMCELLEDONOR, HVIS MAN TAGER MEDICIN?

Man kan godt være stamcelledonor, hvis man f.eks. tager ADHD-medicin, astma- eller allergimedicin, medicin mod depression eller angst, hvis du ellers er rask og har det godt.

Man kan ikke være stamcelledonor, hvis man har hjertekarlidelser, insulinbehandlet sukkersyge eller hvis man har/har haft kræft.

HVEM DONERER MAN TIL?

Oftest patienter med kræft i blodet eller børn med defekter i immunforsvaret.

HVORDAN DONERER MAN STAMCELLEER?

Der er 2 måder at donere stamceller på.

I dag donerer 90% af donorerne via blodet, dvs. via en nål i armen.

Kun ca. 10% af donorerne donerer via knoglemarven, hvor donor er i narkose og stamcellerne tages ud fra hoftekammen.

Hør vores læge fortælle om donationen her:



HVOR OFTE DONERER MAN?

Oftest kun én gang.

Man donerer kun stamceller, hvis man er et match til en specifik patient. Chancen for at blive et match er 0,1%.

DANSKE STAMCELLEDONORER

Læs mere på www.stamcelledonor.auh.dk

FAQS

DANSKE STAMCELLEDONORER

ER MAN ANONYM?

Ja, som stamcelledonor er man anonym.

Efter donationen er det muligt at udveksle anonyme breve mellem patienten og donoren. Først 2 år efter donationen kan anonymiteten ophæves, hvis begge parter ønsker det.

GØR DET ONDT?

Det er intet ubehag ved at udføre mundskrabet ved din tilmelding. Hvis man donerer via blodet vil man opleve ubehag som ved en blodprøvetagning.

Hvis man donerer via knoglemarven vil det foregå i narkose, og man vil efterfølgende være øm over lænden.

KAN MAN SELV VÆLGE HVORDAN MAN DONERER?

Som stamcelledonor bør man være indstillet på at donere på begge måder.

Man vil altid vælge den donationsmetode, der er til størst gavn for patienten, men husk: Det er frivilligt at donere stamceller. Du kan ikke vælge frit, men du kan altid sig nej tak.

ER DER BIVIRKNINGER ?

Der er ingen påviste langtidsbivirkninger ved at donere stamceller.

Hvis man skal donere via blodet, skal man tage medicin i 4 dage for at flytte stamcellerne fra knoglemarven til blodbanen midlertidigt.

Medicinen kan give lette influenzasymptomer og hovedpine.

Symptomerne forsvinder igen, når man stopper med at tage medicinen.

DANSKE STAMCELLEDONORER

Læs mere på www.stamcelledonor.auh.dk